

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | S.A. E AUSILIARI | (1) | (2) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|---|---|-------------------------------|-----|-----|--|
| CRITTOGAME | | | | | |
| Carbone comune (<i>Ustilago maydis</i>) | Interventi agronomici - concimazione equilibrata - ampie rotazioni - raccolta e distruzione dei giovani tumori prima che lascino fuoriuscire le spore | | | | |
| Marciume del fusto (<i>Gibberella zeae</i>) | Interventi agronomici - evitare le semine troppo fitte - evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici - fare ricorso a ibridi resistenti o tolleranti | | | | |
| BATTERIOSI | | | | | |
| Batteriosi (<i>Erwinia stewartii</i> <i>Erwinia chrysanthemi</i>) | Si richiede la segnalazione tempestiva della eventuale presenza in campo di questa malattia per poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio su campioni della coltura colpita | | | | |
| VIROSI | | | | | |
| Virus del nanismo maculato del mais (MDMV) Virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV) | Interventi preventivi eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno e in prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti del virus) | | | | |
| FITOFAGI | | | | | |
| Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.) | Interventi agronomici evitare la coltura in successione a prati stabili per almeno 2 anni In caso di successione a medicaie operare nel modo seguente: - rompere i medicaie nell'estate precedente in modo che la maggior parte delle larve subisca l'azione negativa del secco estivo - rompere il prato immediatamente prima di seminare in modo che gli eventuali elateridi si approfondiscano temporaneamente - con infestazioni in atto, eseguire sarchiature ripetute per creare un ambiente sfavorevole alle larve | | | | I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a. |
| | | Cipermetrina | | | |
| | | Lambdacialotrina | (*) | 1 | (*) Da non considerare nel limite dei Piretroidi |
| | | Zetacipermetrina | (*) | | (*) Utilizzabile in base al formulato entro il 24/9 o 30/11 2021 |
| | | Teflutrin | | | |
| | | Spinosad | | | |
| | Interventi chimici Soglia alla semina presenza accertata secondo le modalità indicate nella tabella 23 (Norme Generali) | | | | |
| Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>) | Interventi agronomici sfibratura degli stocchi e aratura tempestiva | <i>Bacillus thuringiensis</i> | | | |
| | Interventi chimici a cattura avvenuta dell'adulto con appropriate trappole a feromoni | Betacyflutrin | (*) | 2* | (*) Utilizzabile entro il 20 luglio 2021 (*) Tra tutti i Piretroidi |
| | | Deltametrina | | | |
| | | Lambdacialotrina | 1 | | |
| | | Indoxacarb | | | |
| | | Clorantraniliprole | 2 | | |
| | | Spinosad | 3 | | |
| Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.) | Interventi chimici Soglia presenza diffusa di attacchi iniziali Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo localizzato Danni soprattutto alle colture in primo raccolto con infestazioni cicliche | | | | |
| | | Deltametrina | | 2* | (*) Tra tutti i Piretroidi |
| | | Lambdacialotrina | 1 | | |
| | | Betacyflutrin | (*) | | (*) Utilizzabile entro il 20 luglio 2021 |

Regione Emilia-Romagna 2021

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata MAIS DOLCE

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----|----|--|--|
| Nottue fogliari <i>(Helicoverpa armigera</i> <i>Spodoptera spp.)</i> | Interventi chimici | | | | | |
| | Soglia | Clorantraniliprole | 2 | | | |
| | presenza diffusa di attacchi iniziali | Lambdacialotrina | 1 | 2* | (*) Tra tutti i Piretroidi | |
| | | Betacyflutrin | (*) | | (*) Utilizzabile entro il 20 luglio 2021 | |
| Afidi dei cereali <i>(Rhopalosiphum padi</i> <i>Metopolophium dirhodum</i> <i>Sitobion avenae</i> <i>Schizaphis graminum)</i> | Interventi chimici | | | | | |
| | Soglia | Maltodestrina | | | | |
| | presenza di colonie sulle pagine inferiori | Deltametrina | | 2* | (*) Tra tutti i Piretroidi | |
| | | Lambdacialotrina | 1 | | | |
| | | Betacyflutrin | (*) | | (*) Utilizzabile entro il 20 luglio 2021 | |
| | | Pirimicarb | 1 | | | |
| | | | | | | |

Regione Emilia-Romagna 2021

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità