

Difesa integrata CARDO

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | S.a. e AUSILIARI | (1) | (2) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|---|--|------------------------------------|-----|-----|---|
| MALATTIE FUNGINE | | | | | |
| Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) | | Prodotti rameici | (*) | | (*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno |
| Maculatura anulare, malattie delle macchie brune (<i>Ramularia cynarae</i>) | | Azoxystrobin | 2* | | (*) Ammesso in pieno campo |
| | | | | | |
| Oidio (<i>Leveillula</i> spp.) | | Bicarbonato di potassio | | | |
| | | Zolfo | | | |
| | | Azoxystrobin | 2* | | (*) Ammesso in pieno campo |
| Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>) | Interventi agronomici - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno Interventi chimici in presenza di prolungate bagnature | <i>Pythium oligandrum</i> | | | |
| Marciumi basali (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) (<i>Sclerotinia minor</i>) | Interventi agronomici - evitare eccessi di azoto - avvicendamenti con piante poco recettive quali i cereali Interventi chimici interventi preventivi con accertata presenza della malattia negli anni precedenti | Fluxapyroxad + Difenconazolo | 1 | | |
| | | | | | |
| BATTERIOSI | | | | | |
| (<i>Erwinia carotovora</i> var. <i>carotovora</i>) | | Prodotti rameici | (*) | | (*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno |
| | | | | | |
| FITOFAGI | | | | | |
| Afidi (<i>Capitophorus eleagni</i>) | Interventi chimici intervenire in presenza di infestazioni diffuse | Maltodestrina Tau-fluvalinate | 2 | | |
| | | | | | |
| Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Vanessa (<i>Vanessa cardui</i>) Depressaria (<i>Agonopterix</i> spp.) | Soglia di intervento 6-10 mine / foglia | <i>Bacillus thuringensis</i> | | 2 | |
| | | | | | |
| Altri fitofagi occasionali: Cassida (<i>Cassida deflorata</i>) Punteruoli (<i>Larinus cynarae</i>) Mosca (<i>Agromyza andalusica</i>) Altica (<i>Sphaeroderma rubidum</i>) | Interventi agronomici - ampie rotazioni colturali | | | | |
| | | | | | |
| Nottue fogliari (<i>Hydroecia xanthenes</i> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Spodoptera exigua</i>) | Soglia di intervento presenza | Tau-fluvalinate | 2 | | |
| | | | | | |
| Lumache e Limacce (<i>Helix</i> spp. <i>Limax</i> spp.) | Trattamenti localizzati | Metaldeide esca Fosfato ferrico | | | |

Regione Emilia-Romagna 2022

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità