

Controllo integrato delle infestanti di PATATA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	Note
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
		Acido pelargonico	
		Napropamide	
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	(Metribuzin + Flufenacet) (2)(3)	(2) Sulla stessa particella impiegabile 1 volta ogni 3 anni
		(Diflufenican+Metribuzin)(3)	(3) Prodotti il cui impiego è alternativo
		Metribuzin	Non impiegare per le patate primaticce se dopo si coltiva lo spinacio
		(Metribuzin + Clomazone)	
		Pendimetalin	
		Metobromuron	
		Clomazone	
		Pyraflufen-ethyl (4)	(4) Non applicare in presenza del 5% di piante emerse
		Prosulfocarb	
		Aclonifen (5)	(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata
Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti anche a basse dosi con eventuali applicazioni ripetute
	Dicotiledoni	Metribuzin	
	Graminacee	Propaquizafop	Usando Rimsulfuron impiego non strettamente necessario
		Ciclossidim	
		Clethodim	
		Quizalofop-p-etile	
	Quizalofop-etile isomero D		
Pre-raccolta	Disseccamento parte aerea		Si consiglia di applicare nei 10 giorni che precedono la raccolta e nel rispetto del tempo di carenza
		Pyraflufen-ethyl	
		Carfentrazone (6)	(5) Al massimo 2 litri all'anno
		Acido Pelargonico	

(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile ed impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative