

Controllo integrato delle infestanti di PISELLO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	Note
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
		Acido pelargonico	
		Benfluralin	
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (2)	(2) Non ammesso in coltura protetta Far attenzione alla scelta delle colture successive (es. spinacio)
		Clomazone	
		Aclonifen	
		Metribuzin	
Post-emergenza	Dicotiledoni	Bentazone (3)	(3) Non trattare quando la temperatura è al di sotto di 8-10 °C o supera i 25 °C
		Piridate	
	Graminacee	Quizalofop-p-etile	
		Ciclossidim	
		Quizalofop-etile isomero D	
		Propaquizafop	
Dicotiledoni e Graminacee		Imazamox	

**(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ l/ha} \times \text{numero di ha ammissibili}$  è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile ed impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative