

Difesa integrata RAVANELLO

| AVVERSITA' | CRITERI DI INTERVENTO | S.A. E AUSILIARI | (1) | (2) | LIMITAZIONI D'USO E NOTE |
|---|---|--|----------------|----------------|---|
| CRITTOGAME | | | | | |
| Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i> <i>Albugo candida</i>) | Interventi agronomici - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare seme sano - allontanare le piante ammalate Interventi chimici in caso di attacchi precoci | Prodotti rameici Olio essenziale di arancio dolce Mandipropamide | (*) 2* | | (*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno (*) Per ciclo colturale |
| Alternariosi (<i>Alternaria raphani</i>) | Interventi agronomici: - impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici in presenza di sintomi | Prodotti rameici (Fluxapyroxad+ Difenconazolo) Azoxystrobin | (*) 1* 2 | | (*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno (*) Ammesso in pieno campo (*) Ammesso in pieno campo |
| Oidio (<i>Erysiphe cruciferarum</i>) | Interventi chimici in presenza di sintomi | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | | (*) Ammesso in pieno campo |
| FITOFAGI | | | | | |
| Altica (<i>Phyllotreta</i> spp.) | Interventi chimici intervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino | Deltametrina | | 2* | (*) Per i Piretroidi (*) Ammesso in pieno campo |
| Limacce e Chioccioline (<i>Limax</i> spp., <i>Helix</i> spp.) | Interventi chimici alla presenza | Fosfato ferrico | | | |
| Afidi | Interventi chimici intervenire in caso di infestazione generalizzata | Maltodestrina Sali potassici di acidi grassi Lambdacialotrina Cipermetrina Deltametrina | 1 1 | 2* | (*) Per i Piretroidi (*) Ammesso in pieno campo |
| Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera</i> spp.) | Interventi chimici intervenire solo in caso di infestazione generalizzata | Lambdacialotrina Cipermetrina Clorantraniliprole | 1 1 2* | 2* | (*) Per i Piretroidi (*) Ammesso in pieno campo (*) Ammesso in pieno campo |
| Nematodi (<i>Heterodera schachtii</i>) | Interventi agronomici Il ravanello è una pianta ospite di <i>H. schachtii</i> e quindi non può essere coltivata in avvicendamento con la barbabietola da zucchero Utilizzare terreni esenti da <i>H. schachtii</i> | | | | |
| Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.) | Distribuzione localizzata ove sia stata accertata la presenza di larve secondo le modalità riportate nella Tabella 23 (Norme Generali) o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente | Teflutrin | | | |

Regione Emilia-Romagna 2023

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità