

Difesa integrata ORZO

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Oidio, Ruggine, etc.	<u>Interventi chimici</u> per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo, la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici				Consigliata la concia del seme
Carbone (<i>Ustilago tritici</i>)	<u>Interventi chimici</u> ammessa solo la concia del seme				Consigliata la concia del seme
Elmintosporiosi (Macchie reticolate, Maculatura e striatura fogliare) (<i>Pyrenophora graminea</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i>)	<u>Interventi chimici</u> presenza di sintomi <u>Interventi agronomici</u> - evitare i ristoppi - varietà resistenti - semine ritardate - concimazioni azotate equilibrate	Laminarina Pyraclostrobin Mefentrifluconazolo Protioconazolo Tebuconazolo Benzovindiflupyr Bixafen Spiroxamina			(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento anticrittogamici all'anno, esclusi i prodotti biologici (**) Al massimo 1 intervento (*) E' possibile l'uso delle diverse miscele contenute in queste s.a.; In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di 2 sostanze attive
Septoria (<i>Septoria nodorum</i>)	<u>Interventi chimici</u> ammessa solo la concia del seme <u>Interventi agronomici</u> - densità di semina regolari - concimazioni azotate equilibrate				Consigliata la concia del seme
Striatura fogliare (<i>Drechslera graminea</i>)	<u>Interventi chimici</u> ammessa solo la concia del seme <u>Interventi agronomici</u> - varietà resistenti				Consigliata la concia del seme
VIROSI					
Virosi dei cereali	<u>Interventi agronomici</u> - evitare i ristoppi - varietà resistenti				
Virus del nanismo giallo	<u>Interventi agronomici</u> semine ritardate				
FITOFAGI					
Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Metopolophium dirhodum</i> <i>Sitobion avenae</i>)	<u>Soglia</u> pur essendo molto diffusi, nelle nostre aree non hanno mai rappresentato un reale problema				Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo

Regione Emilia-Romagna 2024

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità