

EPOCA	INFESTANTI		SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semina o Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni		Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
Pre-emergenza Gli interventi di pe-emergenza devono essere realizzati con la tecnica del diserbo localizzato sulla fila. In alternativa al diserbo localizzato sono ammessi gli interventi erbicidi di pre-emergenza al massimo sul 50% della SAU investita a mais	Graminacee e Dicotiledoni	ALS	Terbutilazina (2) Dimetenamide-p <b>Pendimetalin (*)</b> S-Metolaclor (3) <b>Aclonifen (*) (4)</b> Pethoxamide Clomazone Mesotrione <b>Sulcotrione (*)</b> Isoxaflutolo (5) <b>Flufenacet (*)</b> Thiencarbazone-methyl (6)	(2) Impiegabile una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento (2) In 1 anno impiegabile al massimo 750 g/ha di sostanza attiva di Terbutilazina (3) Utilizzabile fino al 23/07/2024. Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su barbabietola da zucchero, mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose) oppure impiegabile in post-emergenza sul 50% della superficie a mais (4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata, soia oppure in pre-emergenza sulla fila di semina (riduzione del 50% della dose) (5) Impiegabile solo in pre o post emergenza precoce (6) Al massimo 1 intervento all'anno
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	ALS  HPPD HPPD HPPD	Terbutilazina (2) <b>Pendimetalin (*)</b> Isoxaflutolo (5) Dimetenamide-P Thiencarbazone-methyl (6) S-Metolaclor (3) Pethoxamide (7) Clomazone (7) <b>Tembotrione (*)</b> <b>Sulcotrione (*)</b> Mesotrione	(7) Solo in miscela con altre sostanze attive
Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	ALS ALS ALS ALS  HPPD HPPD HPPD	Rimsulfuron (8) <b>Nicosulfuron (*)</b> Foramsulfuron Thiencarbazone- methyl Terbutilazina (2) <b>Tembotrione (*)</b> <b>Sulcotrione (*)</b> Mesotrione	(8) Possibile ripetere il il trattamento con dosi dimezzate
	Dicotiledoni		Tifensulfuron - metile Tritosulfuron Florasulam <b>Prosulfuron (*) (9)</b> Piridate Clopiralid Dicamba Fluroxipir	(9) Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
	Dicotiledoni e Ciperacee		<b>Halosulfuron metile (*)</b>	
	Dicotiledoni perenni		MCPA (10)	(10) Al massimo sul 10% della superficie aziendale destinata a mais

I trattamenti in post emergenza precoce sono alternativi a quelli in pre-emergenza.

**(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

**(\*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione indicate in grassetto: 4**

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)