

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>CRITTOGAME</b>					
<b>Ticchiolatura</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> )	<b>Interventi chimici</b> Interrompere i trattamenti anticicchiolatura, o ridurli sensibilmente, dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di ticchiolatura	<b>Prodotti rameici</b> <i>Bacillus subtilis</i> Bicarbonato di potassio Zolfo Fosfonato di potassio Captano Dithianon Fluazinam Dodina <b>Tebuconazolo</b> <b>Difenconazolo</b>	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
<b>Mal bianco</b> ( <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Oidium farinosum</i> )	<b>Interventi agronomici</b> Asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme interessate dalla malattia ed eliminare in primavera - estate i germogli colpiti  <b>Interventi chimici</b> Sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio, intervenire preventivamente sin dalla prefioritura, mentre negli altri casi attendere la comparsa dei primi sintomi	Olio essenziale di arancio dolce <b>Tebuconazolo</b>		6 3 2 2*	(*) Tra Tebuconazolo e Difenconazolo
<b>Moniliosi</b> ( <i>Monilinia sp.</i> )		Bicarbonato di potassio <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>			
<b>FITOFAGI</b>					
<b>Afidi</b> ( <i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i> , <i>Eriosoma lanigerum</i> )	<b>Interventi chimici</b> presenza	Olio minerale Sali potassici di acidi grassi Deltametrina Acetamiprid Tau-fluvalinate		2 2 2	
<b>Carpocapsa</b> ( <i>Cydia pomonella</i> )	Installare trappole a feromone per il monitoraggio <b>Soglia di intervento</b> - verificare su almeno 500 frutti/ha la presenza di fori iniziali di penetrazione e trattare al superamento della soglia di 0,3% in giugno, 0,5% in luglio e 0,8% in agosto Tali soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della Confusione o della Distrazione sessuale	Confusione e Distrazione sessuale Virus della granulosi Spinosad Tau-fluvalinate <b>Emamectina</b>		3 2 2	Installare le trappole secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 21 e 22 della parte generale, entro l'ultima decade di aprile o in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali
<b>Cidia del pesco</b> ( <i>Cydia molesta</i> o <i>Grapholita molesta</i> )	<b>Soglia di intervento</b> ovodeposizioni o 1% di fori di penetrazione verificati su almeno 100 frutti	Confusione e Distrazione sessuale Spinosad Tau-fluvalinate <b>Emamectina</b>		3 2 2	
<b>Mosca della frutta</b> ( <i>Ceratitis capitata</i> )	<b>Interventi chimici</b> presenza di prime punture fertili	<i>Attract and kill con</i> <b>Lambda-cialotrina</b> Deltametrina Acetamiprid		2 2	

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p><b>Cimice asiatica</b> (<i>Halyomorpha halys</i>)</p>	<p><b>Monitoraggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc)</li> <li>- eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice</li> </ul> <p><b>Monitoraggio visivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante</li> <li>- nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile</li> </ul> <p><b>Monitoraggio con trappole:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare periodicamente</li> <li>- installare le trappole sui bordi dell'apezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro</li> <li>- le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri)</li> <li>- le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto</li> <li>- non esiste al momento una soglia d'intervento</li> </ul> <p><b>Mezzi fisici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura, anticipando i primi spostamenti dell'insetto</li> </ul>	<p>Acetamiprid</p>	<p>2</p>		