

EPOCA	INFESTANTI	GRUPPO	SOSTANZA ATTIVA	Note
Pre-semina e Pre-trapianto	Graminacee e Dicotiledoni		Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
			Acido pelargonico	
			Napropamide	
			Benfluralin (2)	(2) Utilizzabile fino al 12/05/2024
Pre-emergenza (*) Localizzato	Graminacee e Dicotiledoni		Aclonifen (*) (3)	(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata e soia
Pre-trapianto	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni		(Metribuzin (*) + Flufenacet (*) (4)	(4) Sulla stessa particella impiegabile solo 1 volta ogni 3 anni
			Aclonifen (*) (3)	(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata e soia
			Metribuzin (*)	
			Pendimetalin (*)	
			S-metolaclof (4)	(4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, soia, pomodoro. Utilizzabile fino al 23/07/2024
			Pyraflufen-ethile (5)	(5) Max 1 intervento tra pre e post-trapianto
Post-trapianto Post-emergenza	Dicotiledoni		Pyraflufen-ethile (5) (6)	(5) Max 1 intervento tra pre e post-trapianto + (6) Utilizzare schermatura
			Metribuzin (*)	
	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	ALS (**)	Rimsulfuron	Da solo o in miscela con Metribuzin. Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti a basse dosi con eventuali applicazioni ripetute
	Graminacee	ACCasi (**)	Fluazifop-p-butile	
			Ciclossidim	
			Quizalofop-etile isomero D	
			Quizalofop-p-etile	
			Propaquizafop	
			Clethodim	
Graminacee e Dicotiledoni			Acido pelargonico (7)	(7) Applicazione nell'interfila. Si consiglia l'utilizzo di schermatura

(*) Il diserbo di pre-emergenza deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie

(**) Vincolante - nei terreni torbosi in rotazione con mais: quando si fanno più di 2 trattamenti in post emergenza per il controllo delle graminacee, almeno 1 trattamento deve essere eseguito con prodotti ACCasi

(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile ed impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione indicate in grassetto: 4

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)