

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>CRITTOGAME</b>					
<b>Carbone</b> ( <i>Ustilago</i> spp.)	<b>Interventi chimici</b> ammessa la concia della semente				
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe graminis</i> )	<b>Interventi agronomici</b> - evitare le semine fitte - concimazioni azotate equilibrate - varietà resistenti e tolleranti				
<b>Ruggini</b> ( <i>Puccinia</i> spp.)					
<b>Elmintosporiosi</b> <b>(Macchie reticolate, Maculatura e striatura fogliare)</b> ( <i>Pyrenophora graminea</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i> )	<b>Interventi chimici</b> <b>presenza di sintomi</b>  <b>Interventi agronomici</b> - evitare i ristoppi - varietà resistenti - semine ritardate - concimazioni azotate equilibrate	Laminarina Pyraclostrobin Mefentrifluconazolo Protioconazolo <b>Tebuconazolo</b> <b>Benzovindiflupyr</b> Bixafen Spiroxamina		1*	<b>(*)</b> Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento anticrittogamici all'anno, esclusi i prodotti biologici <b>(**)</b> Al massimo 1 intervento <b>(*)</b> E' possibile l'uso delle diverse miscele contenute in queste s.a.; In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di 2 sostanze attive
<b>FITOFAGI</b>					
<b>Afidi</b> ( <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Metopolophium dirhodum</i> <i>Sitobion avenae</i> )	<b>Interventi agronomici</b> - evitare le semine fitte - concimazioni azotate equilibrate				