

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.)	Interventi chimici concia del seme				Consigliata la concia delle sementi
Elmintosporiosi (<i>Drechslera oryzae</i>)	Interventi chimici tra botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali	(Difenoconazolo + Azoxystrobin) Azoxystrobin Pyraclostrobin Trifloxystrobin		1*	Consigliata la concia delle sementi (*) Al massimo 2 interventi fungicida all'anno sulla coltura, esclusi i prodotti biologici
Brusone delle foglie (<i>Pyricularia oryzae</i>)	Interventi chimici tra botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali	Cos-Oga Zolfo <i>Bacillus subtilis</i>			Consigliata la concia delle sementi
	Interventi agronomici - fare uso di varietà tolleranti - evitare somministrazioni eccessive di azoto - evitare semine troppo ritardate - evitare semine troppo fitte	(Difenoconazolo + Azoxystrobin) Azoxystrobin Trifloxystrobin Pyraclostrobin		1*	(*) Al massimo 2 interventi fungicida all'anno sulla coltura, esclusi i prodotti biologici
FITOFAGI					
CROSTACEI					
Coppette (<i>Triops cancriformis</i>)	Interventi agronomici asciutta				
INSETTI					
Ditteri Chironomidi (<i>Chironomus</i> spp., <i>Cricotopus</i> spp.)	Interventi agronomici asciutta				
Ditteri Efrididi (<i>Hidrella griseola</i>)	Interventi agronomici asciutta				Non sono ammessi interventi chimici
VERMI					
Vermi di risaia (<i>Brachyura</i> spp.)	Interventi agronomici asciutta				Non sono ammessi interventi chimici